


.Intermittent FP · Weekly TXL療法

方法

1) Intermittent FP

5-FU 750-1000mg/body/24hr 持続点滴

CDDP 3-5mg/body/1hr 点滴




2) Intermittent FP・Weekly TXL

TXL90-120mg/body 点滴

day 1 of the each week

CDDP 3-5mg/body/1hr 点滴

5-FU 750-1000mg/body/24hr 持続点滴



TXL前処置

1)ベナ(5mg) 5T 内服

2)生食100ml+ガスター注20mg
+デカドロン20mg

30 ~ 60分 点滴

3)生食250ml+TXL 90 ~ 120mg

120分 点滴

intermittent FP・weekly TXL奏功率

(‘04.9.30)

	著効	有効	不変	進行	奏功率(%)
咽頭癌	2				100.0
食道癌	4	3			100.0
膵癌		2	1		66.7
大腸癌	1	2		1	75.0
肺癌		3	1		75.0
子宮癌		1			100.0
計	7	11	2	1	85.7

intermittent FP・weekly TXL 骨髓系有害事象

(‘04.9.30)

grade	0	1	2	3	4
例数	0	0	9	11	1
%	0	0	42.8	52.4	4.8

grade	0	1	2	3	4
白血球減少	0	3	14	4	0
ヘモグロビン減少	0	1	9	10	1
血小板減少	12	8	1	0	0

*grade1が軽く、grade4はもっとも重症
grade3以上が問題となる

intermittent FP・weekly TXL 消化器系など有害事象

(‘04.9.30)

grade	0	1	2	3	4
食思不振	15	5	1	0	0
口内炎	17	2	2	0	0
悪心	18	2	1	0	-
嘔吐	21	0	0	0	0
下痢	19	1	1	0	0
手足皮膚炎	20	1	0	0	-
色素沈着	19	1	1	-	-
味覚異常	16	5	0	-	-
聴力障害	21	0	0	0	0